

CAMPOFORT® Ultra Ca



Číslo rozhodnutí o registraci: 3310

Kapalné hnojivo

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Znak jakosti	Hodnota v % (hm.)	Hodnota v g/l
celkový vápník jako CaO	7,5	90
celkový hořčík jako MgO	2,0	24
bór jako B	0,1	1

Zvláštní pokyny pro používání: Používá se formou mimokořenové výživy, postřikem na list. Používat pouze v případě skutečné potřeby, nepřekračovat doporučené dávkování.

Obsah balení: 24 kg • 600 kg • 1200 kg (tj. 20 litrů • 500 litrů • 1000 litrů)

Výrobce: AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Česká republika, tel.: +420 383 399 737.

Podmínky skladování: Skladujte v originálních obalech při teplotě -25 °C až +30 °C na chladném a dobře větraném místě. **Maximální množství vrstev při skladování:** Kanystry 21 dm³: 3 vrstvy • kontejner 1 m³: 2 vrstvy. **Doba použitelnosti:** 18 měsíců od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování.

Rozsah a způsob použití: Hektarová dávka: 12 kg / ha (tj. 10 litrů / ha).

Při aplikaci dbáme těchto zásad:

1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejití rosy) nebo pozdně odpolední aplikace, postřik před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené nebo silně napadené chorobami a škůdci.
4. Připravenou postřikovou jichu za stálého míchání ihned aplikujeme až do úplného spotřebování.

Listové hnojivo CAMPOFORT® Ultra Ca je vhodné do porostů, kde se objevují nedostatky vápníku či hořčíku. Jeho úloha spočívá ve stabilizaci buněčných stěn a membrán a rovněž má vliv na aktivitu kyseliny beta-indolyloctové.

Doporučené aplikace

Plodina	Termín aplikace	Dávka	Možnost kombinace	Množství vody
obilniny	BBCH 25 – 61	12 kg (10 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	120 – 300 l/ha
kukuřice	BBCH 13 - 51	12 kg (10 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	150 – 300 l/ha
řepka, hořčice, mák, slunečnice	BBCH 16 – 61	12 kg (10 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	120 – 300 l/ha
brambory, cukrovka	BBCH 14 - 85	12 kg (10 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	150 – 300 l/ha
luskoviny	BBCH 13 – 59	12 kg (10 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	150 – 300 l/ha
chmel, ovocné sady, zelenina, vinná réva	dle potřeb	12 kg (10 litrů)/ha	pesticidy a kapalná hnojiva	300 – 2000 l/ha

Při kombinování s dalšími hnojivy a přípravky na ochranu rostlin doporučujeme vždy provést zkoušku mísitelnosti. Hnojivo přidáváme jako poslední složku. Nikdy nevytváříme tank mix z koncentrovaných složek.

Hnojivo obsahuje malé množství dusičnanového dusíku jako N a to 2,6% (hm).

Obsah rizikových prvků v hnojivu nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb. (Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 20 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

CAMPOFORT® Ultra Ca je bezbarvá až hnědá kapalina, bez zápachu.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Nebezpečná složka: Obsahuje dusičnan vápenatý a chlorid vápenatý.

Kategorie nebezpečí: Způsobuje vážné poškození očí, kategorie 2.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazené, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 PŘI PŘETRVÁVAJÍCÍCH POTÍŽÍCH: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

Způsoby zneškodňování látky/přípravku:

Zbytky přípravku (případně oplachovou vodu) shromážděte k opětovnému použití jako hnojiva.

Výrobek je uváděn do oběhu v souladu s požadavky Nařízení (ES) č. 2003/2003 O hnojivech ze dne 13.10.2013 ve znění pozdějších předpisů. Výrobek odpovídá typu, uvedenému v odstavci C.1.1. Přílohy 1 Nařízení.

AGRA servis: www.agra.cz, tel.: +420 383 399 737

Datum výroby/číslo výrobní šarže:



NEBEZPEČÍ