

HNOJIVO ES

Hnojivo NP roztokové 8-10 s manganom, Mn

8,0 % (v/v) N celkový	vodorozpustný celkový dusík	96 g/l
7,0 % (v/v) N močoviny	vodorozpustný močoviny dusík	82 g/l
1,0 % (v/v) N čpavkový	vodorozpustný amonný dusík	14 g/l
10,0 % (v/v) P ₂ O ₅	vodorozpustný oxid fosforečný	120 g/l
0,4 % (v/v) Mn	vodorozpustný mangan v cheláte s EDTA	5 g/l

Rozsah a spôsob použitia: Hektárová dávka: **12 kg / ha** (tj. 10 litrov / ha)

Pri aplikácii sa držíme týchto zásad:

1. Neprekračujeme doporučenú koncentráciu živinného roztoku.
2. Neaplikujeme pri prudkom slnku a vysokých teplotách, najlepšia je ranná (po zliati rosy) alebo neskorá popoludňajšia aplikácia, postrek pred dažďom alebo za dažďa nie je účinný.
3. Neaplikujeme na porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silne napadnuté chorobami a škodcami.
4. Neaplikujeme na porasty prehnojené dusíkom.
5. Na pôdach s nízkou úrodnosťou sa nemôže účinok mimokoreňovej výživy rastlín dostatočne prejavíť.
6. Pri príprave postrekovej zmesi používajte k rozpúšťaniu prípravku vodu z kategórie tvrdosti „stredne tvrdá“.

Doporučené aplikácie listového hnojiva CAMPOFORT® Fosfamid

Plodina	Vývojová fáza BBCh (BBA)	Druh listového hnojiva	kombinácia s	hektárová dávka hnojiva / optim. množstvo vody
ozimé obilniny, tritikale	13 - 22	CAMPOFORT® Fosfamid	herbicidy, fungicidy, insekticidy	12 kg (10 litrov) CF / 120 litrov až 300 litrov

Výrobca: AGRA GROUP a.s.,

Továrň 9, 387 15 Střelské Hořtice, Česká Republika

Obsah balenia: 24 kg • 600 kg • 1200 kg (tj. 20 litrov • 500 litrov • 1000 litrov)

Podmienky skladovania: Skladujte oddelene od potravín, mimo dosah detí a v pôvodných obaloch. Doba použiteľnosti: **18 mesiacov** od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania. Hnojivo skladujte v pôvodnom balení, v zastrešenej miestnosti, pri teplote v rozmedzí **-5 až +30°C**. Zabráňte dlhodobému priamemu slnečnému žiareniu na kanistry, pretože UV žiarenie spôsobuje zhoršovanie fyzikálnych vlastností plastov. Pri dlhšom skladovaní hnojiva môže časom dôjsť k vzniku jemného tmavého zákalu, či sedimentu. Táto skutočnosť nie je na škodu a nemá nepriaznivý vplyv na účinnosť hnojiva. Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní: Kanister 21 dm³ - 3 vrstvy • kontajner 1 m³ - 2 vrstvy.

Listové hnojivo **CAMPOFORT® Fosfamid** so zvýšeným stimulačným účinkom je určené k jesennej aplikácii do obilnín. Znižuje citlivosť rastlín k stresovým situáciám a podporuje vývoj koreňového systému. Používa sa formou mimokoreňovej výživy postrekom na list.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Pri práci s hnojivom je zakázané piť, jesť, fajčiť. Je treba dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom umyť pokožku rúk teplou vodou a mydlom a ošetriť vhodným reparačným krémom.

Prvá pomoc: Pri zasiahnutí očí: okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri prehltnutí: Vypíť hneď po prehltnutí 0,5 l vlažnej vody a vyhľadajte lekára.

Zasiahnutie pokožky: Rýchlo opláchnuť dostatočným množstvom vody, neskôr dôkladne, ale bez veľkého mechanického dráždenia, umyť vodou a mydlom, odložiť zasiahnutú odev. Vo všetkých ťažších prípadoch, pri prehltnutí alebo zasiahnutí očí vždy vyhľadajte lekársku pomoc.

NAWÓZ WE

Roztvór nawozowy NP 8-10 z manganem, Mn

8,0 % (m/m) N całkowity	rozpuszczalny w wodzie azot całkowity	96 g/l
7,0 % (m/m) N amidowy	rozpuszczalny w wodzie azot amidowy	82 g/l
1,0 % (m/m) N amonowy	rozpuszczalny w wodzie azot amonowy	14 g/l
10,0 % (m/m) P ₂ O ₅	rozpuszczalny w wodzie tlenek fosforu	120 g/l
0,4 % (m/m) Mn	rozpuszczalny w wodzie mangan schelatowany EDTA	5 g/l
Stabilność frakcji schelatowanej dla pH		od 5 do 7,5

Zasady wykonywania oprysku: Dawka na hektar: **12 kg/ha** (tj. 10 litrów/ha)

Przy wykonywaniu oprysku należy przestrzegać następujących zasad:

1. Nie przekraczać zalecanego stężenia roztworu.
2. Nie opryskiwać roślin przy ostrym słońcu i wysokich temperaturach; najlepiej wykonywać oprysk rano (po ustąpieniu rosy) lub późnym popołudniem. Stosowanie nawozu przed wystąpieniem opadów lub w czasie deszczu nie przyniesie oczekiwanych efektów.
3. Nie należy opryskiwać roślin fizjologicznie uszkodzonych oraz zaatakowanych przez choroby i szkodniki.
4. Nie należy opryskiwać roślin przenawożonych azotem.
5. Na glebach o niskiej urodzajności, np. silnie kwaśnych, efekty odzwiania pozakorzeniowego mogą być nie w pełni efektywne.
6. Do przygotowania roztworu należy używać wody do kategorii twardości „średnio twarda“.

Zasady stosowania nawozu CAMPOFORT® Fosfamid:

Roślina	Faza rozwojowa BBCh (BBA, Eilshorn)	Nawóz	możliwość kombinacji	dawka nawozu na hektar / zalecana ilość wody
zboża ozime, pszenżyto	13 - 22	CAMPOFORT® Fosfamid	herbic., fungic., insektyc.	12 kg (10 litrów) CF / 120 litrów - 300 litrów

Producent: AGRA GROUP a.s.,

Továrň 9, 387 15 Střelské Hořtice, Czech Republic

Objętość i masa netto opakowania: 24 kg • 600 kg • 1200 kg (tj. 20 • 500 • 1000 litrów)

Warunki przechowywania nawozu: Przechowywać daleko od żywności, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Okres przydatności: **18 miesięcy** od daty produkcji, przy zachowaniu warunków magazynowania. Nawóz przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w zadanych proporcjach, w temperaturze **od -5 do +30°C**. Unikaj długookresowego bezpośredniego wystawiania na działanie promieni słonecznych, ponieważ promienie UV pogarszają właściwości fizyczne tworzyw sztucznych. Przy dłuższym przechowywaniu może pojawić się ciemny osad, który nie ma wpływu na działanie nawozu. Maksymalna ilość warstw podczas przechowywania: kanistry 21 dm³ - 3 warstwy • kontener 1 m³ - 2 warstwy.

Nawóz dolistny **CAMPOFORT® Fosfamid** o zwiększonym działaniu stymulacyjnym przeznaczony jest do jesiennej aplikacji dla zbóż ozimych. Obniża wrażliwość roślin na sytuacje stresowe i wspiera rozwój systemu korzeniowego.

Nawóz należy stosować dolistnie w formie oprysku drobnokroplistego.

Środki ostrożności:

Podczas stosowania nawozu zakazane jest picie, jedzenie i palenie. Należy przestrzegać zasad higieny osobistej a po pracy i przed jedzeniem umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i zastosować odpowiedni krem ochronny.

Pierwsza pomoc: Przy podrażnieniu oczu: natychmiast dokładnie przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem.

W razie spożycia: wypić bezpośrednio po spożyciu 0,5 l letniej wody i skonsultować się z lekarzem. **Kontakt ze skórą:** szybko przemyć dostateczną ilością wody, następnie dokładnie, ale bez silnego wcierania, umyć wodą z mydłem, zdjąć zabrudzoną odzież. We wszystkich cięższych przypadkach zawsze zasięgnąć pomocy lekarza.

HNOJIVO ES

Kapalně dusíkaté NP hnojivo 8-10 s manganem, Mn

8,0 % (v/v) N celkový	vodorozpustný celkový dusík	96 g/l
7,0 % (v/v) N amidický	vodorozpustný močoviny dusík	82 g/l
1,0 % (v/v) N čpavkový	vodorozpustný amonný dusík	14 g/l
10,0 % (v/v) P ₂ O ₅	vodorozpustný oxid fosforečný	120 g/l
0,4 % (v/v) Mn	vodorozpustný mangan v chelátu s EDTA	5 g/l

Rozsah a způsob použití: Hektárová dávka: **12 kg / ha** (tj. 10 litrů / ha)

Pri aplikaci dbáme těchto zásad:

1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejití rosy) nebo pozdní odpolední aplikace, postřik před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené nebo silně napadené chorobami a škůdci.
4. Nestříkáme porosty přehnojené dusíkem.
5. Na půdách s nízkou úrodností se účinek mimokoreňové výživy rostlin nemůže dostatečně projevit.
6. Při přípravě postřikové jichy použijte k rozpouštění přípravku vodu do kategorie tvrdosti „středně tvrdá“.

Doporučené aplikace listového hnojiva CAMPOFORT® Fosfamid

Plodina	Vývojová fáze BBCh (BBA)	Druh listového hnojiva	kombinace s	hektárová dávka hnojiva / optim. množství vody
ozimé obilniny, tritikale	13 - 22	CAMPOFORT® Fosfamid	herbicidy, fungicidy, insekticidy	12 kg (10 litrů) CF / 120 litrů až 300 litrů

Výrobce: AGRA GROUP a.s.,

Továrň 9, 387 15 Střelské Hořtice, Czech Republic

Obsah balení: 24 kg • 600 kg • 1200 kg (tj. 20 litrů • 500 litrů • 1000 litrů)

Podmínky skladování: Skladujte odděleně od potravín, mimo dosah dětí a v původních obalech. Doba použitelnosti: **18 měsíců** od data výroby hnojiva při dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v rozmezí **-5 až +30°C**. Zabráňte dlouhodobému přímému slunečnímu svitu na kanistry, neboť UV záření způsobuje zhoršování fyzikálních vlastností plastu. Při delším skladování hnojiva může časem dojít ke vzniku jemného tmavého zákalu, či sedimentu. Tato skutečnost není závadou a nemá nepříznivý vliv na účinnost hnojiva. Max. množství vrstev při skladování: kanistry 21 dm³ - 3 vrstvy • kontejner 1 m³ - 2 vrstvy.

Listové hnojivo **CAMPOFORT® Fosfamid** se zvýšeným stimulačním účinkem je určeno k podzimní aplikaci do ozimových obilovin. Snižuje citlivost rostlin ke stresovým situacím a podporuje vývoj kořenového systému. Používá se formou mimokoreňové výživy postřikem na list rostlin.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetriť vhodným reparačním krémem.

První pomoc: Při zasažení očí: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požiti: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždení, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený odev. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.